

◇◇ピアス、軟骨ピアス 穴あけ同意書◇◇

方法 ※ピアスホールを開けたい場所に 油性マジックで印をつけます。


※耳たぶの下から5～7mmのところがおすすめです。

(フック型のピアスで裂けることがあるので、5mm以下の場所は避けます)

※保冷剤で冷却します。

※消毒をしてピアッシングをおこないます。

※当日つけたファーストピアスは1か月外せません。



副反応

- ・ 保冷剤で凍傷をおこして、赤みただれ痛みを起こすことがあります。
- ・ ピアス穴から感染をおこすことがあります。
- ・ 金属アレルギーのある方は かゆみ 汁がでることがあります。
(当院では医療用ステンレスや純チタン製のアレルギーの起こりにくい素材を使用しています)
- ・ ピアス穴の周囲にしこりができたり 皮膚が盛り上がる場合があります。
- ・ ケロイド体質の方は、ピアスホールを閉じた後に、その皮膚が盛り上がることもあります。
- ・ キャッチをしめすぎると ピアスが皮膚にうまってしまう場合があります。
- ・ 耳たぶの形状によって、多少の左右差、方向、位置のずれが生じる場合があります。
- ・ 軟骨ピアスの方へ
キシロカイン等の局所麻酔使用時、アナフィラキシー症状等アレルギー反応が起きる事があります。

※高校生の方へ※

麻酔を使用の場合はかならず保護者の方と一緒にご来院ください

～ ピアスを開けたあと ～

- ◇ 耳たぶのピアスは、ホールが完成するまで、1か月外さないでください。(軟骨は約1.5～2か月)
- ◇ 毎日 石鹸 シャワーでホールとピアスの周囲を洗ってください。
- ◇ 洗う時はピアスを少し回して、動かしてください。
- ◇ 消毒はいりません (かぶれることがあるため)。
- ◇ 腫れ、痛み、出血 ピアスが埋まった など 心配な場合はご来院ください。
- ◇ 1か月後、ピアスのキャッチが取れない場合は次のピアスを持ってご来院ください。

AISAN クリニック皮膚科

☐ 医師 中野 章希

☐ 医師 安富 倫子

=====

☐ 私は上記の説明、副反応を理解しましたので、処置を受けることに同意します。

↑ 同意の場合ここに✓をいれてください

年 月 日 (耳 : ピアス穴あけ)

お名前

代諾者お名前 (未成年の場合)

(患者との続柄) 例父、母等